

PM för vård-/akutavdelningar

Att tänka på efter undersökningar med intravaskulära röntgenkontrastmedel.

(angiografi/kärlintervention, datortomografi, flebografi, urografi)

Hydrering

För att förhindra påverkan på njurfunktionen bör patienten hållas normalhydrerad dygnet efter undersökningen i form av dryck eller intravenöst dropp med hänsyn tagen till eventuell hjärt-/njursvikt eller andra riskfaktorer för övervätskning. Patienter i dialys bör inte aktivt hydreras utan i stället inta sin normala dygnsdos av vätska.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Följ diures och plasma-kreatinin under minst 2-3 dygn efter undersökningen.

Patienter som står på metformin

Om metformin utsatts skall plasma-kreatinin kontrolleras tidigast 2 dygn efter kontrastmedelstillförelsen för att avgöra om kontrastmedlet påverkat njurfunktionen. Remittenten tar därefter ställning till om metformin skall återinsättas.

Allergisk senreaktion

I sällsynta fall kan kontrastmedlen ge upphov till sena former av allergiska reaktioner (Typ 4), vanligast hudutslag, inom ett dygn upp till en vecka efter undersökningen.

Rapportering av biverkningar

Biverkningar (njurpåverkan, allergiska reaktioner, blödning, extravasering, etc.) som noteras sedan patienten återkommit till avdelningen efter en undersökning SKALL rapporteras till röntgenavdelningen så att de kan registreras och vid behov en varning läggs in i remissystemet.