
Latent tuberkulos

När förebyggande behandling ges
Smittskyddsläkarnas informationsblad

Hur smittar tuberkulos?

En person med tuberkulos i lungor kan smitta andra när personen hostar inomhus. Tuberkulos i andra organ och latent tuberkulos smittar inte. Det är ovanligt att barn före puberteten är smittsamma. Risken att smittas är störst om man tillbringar lång tid i samma rum, till exempel delar hushåll.

Vad är latent tuberkulos?

Alla som blir smittade blir inte sjuka i tuberkulos. Hos de flesta personer kan kroppens försvarskrafter stoppa tillväxten av bakterierna. Bakterierna kan finnas kvar i kroppen men är inte aktiva. Detta tillstånd kallas **latent tuberkulos**.

Latent tuberkulos är ingen sjukdom

Du som efter blodprov (IGRA-test) eller hudtest (tuberkulintest) fått besked om att du har latent tuberkulos har inga sjukdomssymtom som beror på tuberkulos. Du kan inte sprida dessa bakterier vidare till andra personer.

Det finns dock en risk att utveckla tuberkulossjukdom senare i livet, men risken är liten.

Förebyggande behandling ges i vissa fall

Vissa personer med ökad risk att senare bli sjuka erbjuds förebyggande behandling. I första hand gäller detta vid graviditet och efter förlossning, till barn och ungdomar, samt till personer med försvagat immunförsvar, till exempel vid cancerbehandling, insulinbehandlad diabetes, svår njursjukdom. Förebyggande behandling ges ibland även till personer som nyligen har utsatts för tuberkulossmitta.

Du rekommenderas förebyggande behandling

Du har latent tuberkulos och din läkare rekommenderar behandling i förebyggande syfte. Detta för att minska risken att du i framtiden ska bli sjuk i tuberkulos.

Om du i framtiden drabbas av långvarig hosta (mer än tre veckor), nattsvettningar, feber eller ofrivilligt går ner i vikt, ska du kontakta läkare för att bli undersökt för tuberkulos.

Namn på mottagningen:.....

Du har träffat:..... (Läkare)

.....(Sjuksköterska)

Telefonnummer/telefontid till mottagningen:.....