

المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين (VRE)، معلومات المريض

لماذا حصلت على هذه المعلومات؟

أظهرت الفحوص أن لديك بكتيريا مقاومة لبعض المضادات الحيوية. يمكنك الاطلاع في نشرة المعلومات هذه على ما يعني ذلك وما الذي ينبغي الانتباه إليه لكيلا تنقل العدوى إلى الآخرين.

ما هي المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين (VRE)؟

يعني VRE المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين وهي نوع من البكتيريا التي أصبحت مقاومة لنوع معين من المضادات الحيوية.

يمكن أن توجد المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين في الأمعاء كجزء من النسيج الجرثومي المعوي دون أن يصاب المرء بالمرض. يدعى ذلك بأن المرء حامل للعدوى. وتماماً مثل البكتيريا العادية يمكن أحياً للمعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين أن تسبب التهاباً، على سبيل المثال التهاب الجهاز البولي.

البكتيريا معوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين لا تسبب المزيد من الالتهابات أو التهاب أكثر خطورة من التهاب العادي، ولكن عند علاج التهاب ما، يجب استعمال أنواع معينة من المضادات الحيوية.

كيف تنتشر المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين؟

يمكن أن تنتشر المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين بين الناس عن طريق اليدين الملوثة ببكتيريا الأمعاء، على سبيل المثال بعد الذهاب إلى المرحاض. كما يمكن أيضاً أن تنتشر العدوى عن طريق الأكل والماء.

الشخص الذي يكون حاملاً للمعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين في الأمعاء نادراً ما ينقل العدوى للأخرين. في بعض الأوضاع تزداد كمية البكتيريا ويزداد حينذاك أيضاً خطر نقل العدوى. يسمى ذلك بعامل الخطير لنقل العدوى.

عوامل الخطير لنشر العدوى هي:

- الإسهال
- القثطار أو فغر القولون
- القرح المفتوح.

هل يمكن التخلص من المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين؟

قد تبقى المعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين في الأمعاء لمدة أشهر أو أحياً سنوات. لا يمكن بشكل مسبق معرفة المدة التي سيكون فيها المرء حاملاً للبكتيريا، ولكن معظم الناس يتخلصون منها مع مرور الوقت. غالباً ما لا توجد الحاجة لإجراء فحص للبراز.

ما الذي يجب أن أضعه في اعتباري حتى لا أنقل العدوى للأخرين؟

أهم ما يمكنك فعله هو أن تكون حريصاً على نظافة اليدين. إذا لم يكن لديك أي عوامل خطير فإن خطر أن تنقل العدوى للأخرين يعتبر ضئيلاً ويمكنك معاشرة الآخرين كالمعتاد. كما يمكنك ممارسة الجنس كالمعتاد. ويمكنك العمل كالمعتاد. يمكن للأطفال الذهاب إلى دار الحضانة والمدرسة والمشاركة في جميع النشاطات.

روتينيات النظافة الخاصة لمن لديه عوامل خطير

إذا كان لديك عوامل خطير لنقل العدوى فيزداد خطر نقل العدوى للأخرين. يجب عليك الانتباه إلى ما يلي:

- كن حريصاً على نظافة اليدين. استعمل منشفة وأدوات النظافة الخاصة بك.
- لا تستحم في حوض سوية مع الآخرين.
- ضع ضمادة على القرح وقم بتغيير الضمادة إذا كان السائل يسيل عبرها.
- إذا كان لديك قثطار ينبغي عليك حمله تحت الملابس.
- أغسل يديك بعد لمس القرح أو الضمادة أو القثطار.

هل يجب علي أن أقول للآخرين أنني حامل للعدوى؟
لا تحتاج إلى أن تقول للآخرين أنك حامل للمعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين.

إذا كنت بحاجة إلى علاج بالمضادات الحيوية فمن المهم للغاية أن تحصل على النوع الصحيح من المضادات الحيوية. كما ينبغي أخذ عينة من البكتيريا قبل البدء بالعلاج. لذلك نرجو منك أن تقول للطبيب أنك حاملًا للمعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين.

إذا دخلت إلى المستشفى أو ستخضع لعملية جراحية أو ستقيم في مسكن خاص فإنه من الجيد أن تخبر طبيبك بأنك حاملًا للمعوية الطيرية المقاومة للفانكوميسين.

تبغ المخالطين

طبقاً لقانون مكافحة انتشار الأمراض المعدية أنت ملزم بالمساهمة في تتبع المخالطين. يعني ذلك إعطاء المعلومات لمقدمي الرعاية لكي يمكن لهم تقييم متى وأين وكيف يمكن أن تكون العدوى انتقلت إليك، وإن كان من الممكن أن تكون نقلت العدوى للآخرين.

ما تقوله هو محاط بسرية المعلومات (سري) ولن يعرف الأشخاص الذين تتحدث عنهم من أنت.

معلومات حول نشرة مكافحة انتشار الأمراض المعدية

تم إعداد النشرة من قبل الجمعية السويدية لأطباء مكافحة انتشار الأمراض المعدية وهي نشرة سارية في كافة أنحاء السويد.