Smittskydds-läkarföreningen

SMITTSKYDDSBLAD – PATIENTINFORMATION

PERSISKA – LATENT TUBERKULOS, DÄR BEHANDLING GES

سل نهفته، اطلاعات بیمار

مواقعی که درمان پیشگیرانه ارائه می شود. برگه اطلاعاتی پزشکان کنترل عفونت

سل چگونه منتقل می شود؟

فرد مبتلا به سل در ریه می تواند دیگران را در هنگام سرفه کردن در داخل خانه آلوده کند. سل سایر اندام ها و سل نهفته مسری نیستند. مسری بودن کودکان قبل از بلوغ غیر معمول است. اگر مدت طولانی را در یک اتاق بگذرانید، به عنوان مثال در یک خانه مشترک، خطر عفونت بیشتر است.

سل نهفته چیست؟

همه کسانی که مورد سرایت قرار می گیرند به سل مبتلا نمی شوند. در بیشتر افراد، قدرت دفاعی بدن می توانند رشد باکتری ها را متوقف کنند. باکتری ها می توانند در بدن باقی بمانند اما فعال نیستند. به این حالت **سل نهفته** می گویند

سل نهفته یک بیماری نیست

شمایی که پس از آزمایش خون (تست سل) و یا تست پوست (تست توبرکولین) مطلع شده اید که به سل نهفته مبتلا هستید، هیچ علامت بیماری ناشی از سل ندارید. شما نمی توانید این باکتری ها را به افراد دیگر منتقل کنید.

با این وجود، خطر ابتلا به سل در مراحل بعدی زندگی وجود دارد، اما این خطر ناچیز است.

در برخی موارد درمان پیشگیرانه انجام می شود

به برخی از افرادی که خطر بیشتری برای بیمار شدنشان در آینده وجود دارد درمان پیشگیرانه ارائه می شود این در درجه اول در دوران بارداری و پس از زایمان، برای کودکان و نوجوانان، و همچنین برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، به عنوان مثال در درمان سرطان، دیابت تحت درمان با انسولین و بیماری کلیوی حاد اعمال می شود. گاهی اوقات درمان پیشگیرانه در مورد افرادی که اخیراً در معرض عفونت سل قرار گرفته اند نیز انجام می شود

درمان پیشگیرانه به شما توصیه می شود

شما سل نهفته دارید و پزشک درمان پیشگیرانه را توصیه می کند. این برای کاهش خطر ابتلا به سل در آینده است

اگر در آینده دچار سرفه طولانی مدت (بیش از سه هفته)، تعریق شبانه، تب یا کاهش غیرارادی وزن شدید، با پزشک خود تماس بگیرید تا از نظر سل معاینه شود

(Kontaktuppgifter) اطلاعات برای تماس

(Namn på mottagningen) نام مرکز درمانی

……

(Du har träffat) فردی که با وی ملاقات کردید

(Läkare) پزشک ……

(Sjuksköterska) پرستار ……

(Telefonnummer/telefontid till mottagningen) شماره تلفن/ساعات تلفنی مرکز

……