Tuberculose latente, informações para pacientes

Quando é administrado um tratamento preventivo. Ficha de informação dos médicos de prevenção e controlo de doenças infeciosas

Como a tuberculose se transmite?
Uma pessoa com tuberculose pulmonar pode contagiar outras pessoas ao tossir em espaços interiores. A tuberculose em outros órgãos do corpo e a tuberculose latente não são contagiosas. As crianças pré-púberes raramente são contagiosas. O risco de contágio é maior quando se permanece muito tempo no mesmo ambiente, por exemplo, ao partilhar a mesma habitação.

O que é a tuberculose latente?
Nem todas as pessoas infetadas com tuberculose desenvolvem a doença. Na maior parte dos casos, o sistema imunitário consegue conter a multiplicação das bactérias infeciosas. As bactérias podem permanecer no corpo, mas num estado inativo. Esta situação é denominada **tuberculose latente**.

A tuberculose latente não é uma doença
Se após uma análise sanguínea (teste IGRA) ou um teste cutâneo tuberculínico tiver sido diagnosticado(a) com tuberculose latente, isso significa que é assintomático(a) e que não pode transmitir as bactérias da tuberculose a outras pessoas.

No entanto, há o risco de desenvolver a doença na forma ativa numa fase posterior da vida, mas esse risco é pequeno.

Em alguns casos é administrado um tratamento preventivo
A certas pessoas suscetíveis de contraírem a doença numa fase posterior é sugerido um tratamento de prevenção. Tal aplica-se, em primeiro lugar, em casos de gravidez e pós-parto, a crianças e adolescentes e a pessoas com sistema imunitário fragilizado, por exemplo, na sequência de tratamentos do cancro, insulinodependência ou doenças renais graves. Por vezes, o tratamento preventivo é também administrado em casos de exposição recente à infeção tuberculosa.

Foi-lhe recomendado(a) um tratamento preventivo
Foi diagnosticado(a) com tuberculose latente e o seu médico recomendou um tratamento preventivo com vista a reduzir o risco de no futuro adoecer com tuberculose.

Se, no futuro, sentir sintomas como tosse persistente (durante mais de três semanas), suores noturnos, febre ou perda involuntária de peso, deve contactar o seu médico para uma consulta de rastreio de infeção tuberculosa.

Dados de contacto (Kontaktuppgifter)

Nome do consultório *(Namn på mottagningen)* …….

Foi atendido(a) por *(Du har träffat)*

……..…… Médico(a) *(Läkare)*

…….. Enfermeiro(a) *(Sjuksköterska)*

Número de telefone/horário de atendimento telefónico do consultório *(Telefonnummer/telefontid till mottagningen)*

……..……