วัณโรคแฝง, ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เมื่อให้การรักษาเชิงป้องกัน เอกสารข้อมูลแพทย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

วัณโรคติดต่อได้อย่างไร

ผู้ที่เป็นวัณโรคปอดสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้เมื่อบุคคลนั้นไอภายในบ้าน
วัณโรคของอวัยวะอื่นและวัณโรคแฝงจะไม่ติดต่อ เป็นเรื่องปกติที่เด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์จะติดเชื้อได้
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจะมีระดับสูงสุดหากคุณอยู่ในห้องเดียวกันเป็นเวลานาน เช่น
อยู่ร่วมกันในครัวเรือน

วัณโรคแฝงคืออะไร

ไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะป่วยเป็นวัณโรค
ในคนส่วนใหญ่ภูมิต้านทานของร่างกายจะสามารถหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้
เชื้อแบคทีเรียอาจยังอยู่ในร่างกายแต่จะอยู่นิ่ง ไม่ทำปฏิกิริยาใด ๆ ต่อร่างกาย ภาวะนี้เรียกว่า **วัณโรคแฝง**

วัณโรคแฝงไม่ใช่โรค

ผู้ที่ได้รับการแจ้งผลการตรวจเลือด (การตรวจ IGRA) หรือตรวจผิวหนัง
(การตรวจคัดกรองวัณโรคทางผิวหนัง)
ว่าคุณติดเชื้อวัณโรคแฝงโดยไม่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากวัณโรค
คุณไม่สามารถแพร่เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ไปยังผู้อื่นได้

อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคต่อมาภายหลังในชีวิตได้แต่ความเสี่ยงนั้นมีน้อย

ในบางกรณีมีการรักษาเชิงป้องกัน

บางคนที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยในภายหลังจะได้รับการรักษาเชิงป้องกัน
โดยส่วนใหญ่จะกรณีในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด เด็กและวัยรุ่น ตลอดจนผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
เช่น ในการรักษามะเร็ง โรคเบาหวานที่ต้องใช้ยาอินซูลิน โรคไตระยะร้ายแรง
บางครั้งยังให้การรักษาเชิงป้องกันกับคนที่เพิ่งติดเชื้อวัณโรคอีกด้วย

ขอแนะนำให้รับการรักษาเชิงป้องกัน

หากคุณเป็นวัณโรคแฝงและแพทย์ของคุณแนะนำให้รับการรักษาเชิงป้องกัน
การรักษาเชิงป้องกันนี้จะลดความเสี่ยงที่คุณจะป่วยเป็นวัณโรคในอนาคต

หากคุณมีอาการไอเป็นเวลานาน (เกินสามสัปดาห์) เหงื่อออกตอนกลางคืน มีไข้
หรือน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ คุณควรติดต่อแพทย์เพื่อตรวจหาวัณโรค

ข้อมูลสำหรับติดต่อ (Kontaktuppgifter)

ชื่อคลินิก *(Namn på mottagningen)* .....

คุณได้พบ *(Du har träffat)*

..... แพทย์ *(Läkare)*

..... พยาบาล *(Sjuksköterska)*

หมายเลขโทรศัพท์/เวลาบริการทางโทรศัพท์ของคลินิก *(Telefonnummer/telefontid till mottagningen)*

.....