

التهاب نهفته مرض سل – زمانیکه تحت تدای قرار می گیرد

معلومات برای مریضان از سوی داکتران کنترول امراض ساری سویدن.

چرا این معلومات به من داده شده است؟

یک آزمایش نشان داده است که شما التهاب نهفته مرض سل دارید. داکتر شما تشخیص داده است که برای کاهش خطر اینکه بعداً به مرض سل مبتلا شوید، به تدای نیاز دارید.

در اینجا می‌توانید بدانید که به چه چیزهایی باید توجه کنید.

التهاب نهفته مرض سل چیست؟

التهاب نهفته سل به این معنی است که میکروب های مرض سل به شما سرایت کرده است، اما مریض نیستید. وقتی که به کسی میکروب های مرض سل سرایت می کند، سیستم معافیتی بدن عکس العمل نشان می‌دهد و این عکس العمل را می‌توان با آزمایش خون یا آزمایش جلدی اندازه‌گیری کرد. زیادتیر کسانی که آلوده شده‌اند، سالم می‌مانند، اما خطر کمی وجود دارد که بعداً در طول زندگی بر اثر توبرکلوز مریض شد.

خطر اینکه فرد بعداً مریض شود، برای کسانی که به‌تازگی آلوده شده‌اند، زنان حامله، زنانی که به‌تازگی ولادت کرده‌اند، اطفال، نوجوانان و افرادی که به دلیل بیماری یا تدای سیستم معافیتی ضعیف دارند، بیشتر است.

آیا التهاب نهفته مرض سل سرایت می‌کند؟

خیر، التهاب نهفته مرض سل سرایت نمی‌کند. توبرکلوز فقط زمانی می‌تواند سرایت کند که یک شخص بیمار باشد و بیماری توبرکلوز درشش‌ها باشد.

آیا برای التهاب نهفته مرض سل به تدای ضرورت دارم؟

بلی، داکتر شما تشخیص داده است که برای کاهش خطر اینکه بعداً بر اثر توبرکلوز مریض شوید، به تدای ضرورت دارید.

به کدام نکات باید توجه کنم؟

هیچ راهی وجود ندارد که بتوان با آن مشخص کرد که آیا بعد از تدای همه میکروب‌ها از بین رفته‌اند یا نی و امکان دارد که در آینده دوباره مصاب شوید.

اگر در آینده برای مدت طولانی (بیش از سه هفته) دچار مشکلاتی مانند سرفه، تب، عرق شبانه یا کاهش ناخواسته وزن شدید، به داکتر مراجعه کنید. به داکتر بگویید که قبلاً برای التهاب نهفته مرض سل تدای شده‌اید.

معلومات تماس (Kontaktuppgifter)

مرکز صحتی (Mottagning).....

.....

تلیفون (Telefon).....