

## INFORMATIONSBLAG

Patientinformation från Sveriges smittskyddsläkare  
Franska – Latent tuberkulosinfektion – när behandling ges

### Infection tuberculeuse latente – avec traitement

Informations aux patients issues de la Direction régionale des services de lutte contre les maladies infectieuses.

#### Pourquoi ai-je reçu ce document ?

Un test a montré que vous avez une infection tuberculeuse latente. Votre médecin estime que vous avez besoin d'un traitement pour réduire le risque de développer une tuberculose active plus tard.

Voici ce que vous devez savoir.

#### Qu'est-ce qu'une infection tuberculeuse latente ?

Une infection tuberculeuse latente signifie que vous avez été infecté·e par des bactéries tuberculeuses, mais que vous n'êtes pas malade à cause de cela.

Lorsqu'une personne est infectée par des bactéries de la tuberculose, le système immunitaire du corps réagit et cela peut être mesuré par des analyses de sang ou des tests cutanés. La plupart des personnes infectées restent en bonne santé, mais il existe un petit risque de développer une tuberculose active plus tard dans la vie.

Le risque de tomber malade plus tard est le plus élevé chez les personnes qui ont été infectées récemment, les femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie ou d'un traitement médicamenteux.

#### L'infection tuberculeuse latente est-elle contagieuse ?

Non, l'infection tuberculeuse latente n'est pas contagieuse. La tuberculose ne peut se transmettre que lorsqu'une personne est malade et que la maladie est présente dans les poumons.

#### Dois-je suivre un traitement pour une infection tuberculeuse latente ?

Oui, votre médecin estime que vous devez suivre un traitement pour réduire le risque de développer la tuberculose plus tard.

#### À quoi je dois faire attention ?

Il n'y a aucun moyen de mesurer de façon certaine que toutes les bactéries ont bien disparu après le traitement; vous pouvez donc être infecté·e de nouveau à l'avenir.

Si à l'avenir vous avez des symptômes persistants (c'est-à-dire pendant plus de trois semaines) tels que toux, fièvre, sueurs nocturnes ou perte de poids involontaire, vous devez consulter un médecin. Indiquez que vous avez suivi un traitement pour une infection tuberculeuse latente.

#### Coordonnées (Kontaktuppgifter)

Consultation ou service (Mottagning).....

.....

Téléphone (Telefon).....