

INFORMATIONSBLAD

Patientinformation från Sveriges smittskyddsläkare

Franska – Latent tuberkulosinfektion – när behandling inte ges

Infection tuberculeuse latente – sans traitement

Informations aux patients issues de la Direction régionale des services de lutte contre les maladies infectieuses.

Pourquoi ai-je reçu ce document ?

Un test a montré que vous avez une infection tuberculeuse latente.

Voici ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce qu'une infection tuberculeuse latente ?

Une infection tuberculeuse latente signifie que vous avez été infecté·e par des bactéries tuberculeuses, mais que vous n'êtes pas malade à cause de cela.

Lorsqu'une personne est infectée par des bactéries de la tuberculose, le système immunitaire du corps réagit et cela peut être mesuré par des analyses de sang ou des tests cutanés. La plupart des personnes infectées restent en bonne santé, mais il existe un petit risque de développer une tuberculose active plus tard dans la vie.

L'infection tuberculeuse latente est-elle contagieuse ?

Non, l'infection tuberculeuse latente n'est pas contagieuse. La tuberculose ne peut se transmettre que lorsqu'une personne est malade et que la maladie est présente dans les poumons.

Y a-t-il un traitement contre l'infection tuberculeuse latente ?

Les personnes présentant un risque accru de contracter la tuberculose reçoivent un traitement préventif. Cela concerne par exemple les enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Votre médecin estime que vous n'avez **pas** besoin de traitement pour le moment.

À quoi je dois faire attention ?

Si à l'avenir vous avez des symptômes persistants (c'est-à-dire pendant plus de trois semaines) tels que toux, fièvre, sueurs nocturnes ou perte de poids involontaire, vous devez consulter un médecin. Expliquez que vous avez une infection tuberculeuse latente.

Si vous tombez enceinte, si vous souffrez d'un diabète traité à l'insuline ou d'une maladie rénale grave, si vous devez suivre un traitement contre le cancer ou si votre système immunitaire est affaibli pour une autre raison, il est très important que vous disiez à votre médecin que vous avez une infection tuberculeuse latente. Vous pourriez en effet alors avoir besoin d'un traitement préventif pour ne pas développer une tuberculose active.

Coordonnées (Kontaktuppgifter)

Consultation ou service (Mottagning).....

.....

Téléphone (Telefon).....