

SWESEMs utbildningsutskotts medsittningsmall

Rubrik

Fiberlaryngoskopi

2015-01-07

Indikationer

- Dysphagi eller odynophagi
- Heshet, stridor
- Misstanke om främmande kropp
- Angioödem
- Inhalationstrauma, t ex exponering för brandrök, frätande gaser

Relativa kontraindikationer

- Kräkning och aspiration
- Blödning, exempelvis hos patient med koagulopati
- Laryngospasm vid epiglottit eller akut hotande övre luftväg
- Trauma mot mjukdelarna

1-Förbereda utrustning

- Sätt på skyddsutrustning: handskar, visir och rock
- Avsvällande spray
- Bedövningsspray t.ex lidokain (Xylocain® kutan spray 10 mg/dos)
- Fiberlaryngoskop: kontrollera funktion (rörelser, ljuskälla, fokus)
- Anti-fogging solution eller varmt vatten
- Lubricerande gel
- Sug och sugkateter: kontrollera funktion

2-Förbereda patienten

- Informerar patienten om proceduren
- Optimerar patientens position
- Välj näsborre, bedöva i näsan, nasopharynx +/- oropharynx och sväll av

3-Procedur

- Värm ändan av fiberlaryngoskopet i varmt vatten eller använd anti-fogging solution
- Applicera rikligt med lubricerande gel på fiberlaryngoskop eller skyddande strumpa
- Dig 4 & 5 på näsrygg; stabilisera skopet mellan Dig 1 & 2; för spetsen in i patientens nashåla
- Börja titta och avancera fiberlaryngoskopet in i nasopharynx
- Rensa linsen från imma eller slem vid behov
- I pharynx riktas toppen kaudalt, visualisera tungbasen och tonsillerna
- Hitta larynx, undersök anatomin och funktionen vid respiration & fonation
- Släpp kontroll av fiberlaryngoskopets spets, dra ut skopet, rengör skopet

Helhetsbedömning

- Genomför färdigheten med tillräcklig manuell färdighet

Instruktör/handledare**Specialitet**