

SWESEMs utbildningsutskott

Rubrik

Initialt omhändertagande av det nyfödda barnet - medsittning

2018-04-09

Överblick

- Säkerhetsbedömning-handskar.
- Torka/stimulera barnet¹, motverka hypotermi², och översiktlig bedömning av andning/tonus.
Om barnet inte svarar adekvat fortsätter man längs algoritmen nedan. Starkt önskvärt att man då startar en timer för att kunna genomföra åtgärderna inom specificerade tidsramar.

BEDÖMNINGAR

ÅTGÄRDER

Airway & C-spine

<input type="checkbox"/> Skriker barnet? Om ej:	<ul style="list-style-type: none">• Lagg på rygg med huvudet i neutralt läge³• Inspektera munhålan. Sug om mekonium OCH livlöst⁴
---	---

Breathing

<input type="checkbox"/> Tillräcklig egenandning ⁵ ? Om ej:	<ul style="list-style-type: none">• Ventilera 60/min med mask⁶ senast inom 60 sek efter förlossningen. Om ventilation inte är effektiv, justera grepp. Säkerställ effektiv ventilation innan du fortsätter till Circulation⁷
<input type="checkbox"/> Koppla pulsoximeter höger hand	<ul style="list-style-type: none">• Tillför extra O₂ om SpO₂ < 50% efter 3 min

Circulation

<input type="checkbox"/> Hjärtfrekvens ⁸ < 60/min trots > 60 sek med effektiv ventilation? Om ej:	<ul style="list-style-type: none">• Bröstkompressioner⁹• 3:1 kompressioner:ventilationer, 90:30/min
--	---

Drugs

<input type="checkbox"/> Hjärtfrekvens < 60/min trots effektiv ventilation med thoraxkompression	<ul style="list-style-type: none">• Adrenalin 10 µg/kg (Adrenalin 0,1 mg/ml x 0,3 ml) via navelvenskateter eller IO nål• Överväg kristalloid/blod 10 ml/kg bolus IV• Överväg naloxon 0,1 mg/kg IV eller IM
--	--

End

<input type="checkbox"/> Hjärtfrekvens > 60/min?	<ul style="list-style-type: none">• Avbryt thoraxkompression
<input type="checkbox"/> Tillräcklig egenandning?	<ul style="list-style-type: none">• Avbryt ventilation
<input type="checkbox"/> Puls < 60/min efter 15 min?	<ul style="list-style-type: none">• Överväg att avbryta återupplivningsförsök

Återkoppling till läkaren: