

SWESEMs specialisttentamensgrupp

Rubrik

Distal radiusfraktur - medsittning

2023-04-13

1-Klinisk undersökning

- Inspektion och palpation
- Distalstatus: perfusion och känsel

2-Röntgentolkning

- Mät volar vinkeln
- Mät radial inkliniation
- Mät ulnar varians

3-Beslut om reponering

	Normalt	Icke-operativ behandling
<input type="checkbox"/> Volar vinkel	11°	15° till -10°
<input type="checkbox"/> Radial inkliniation	24°	> 15°
<input type="checkbox"/> Ulnar varians	-1 mm	< 2 mm

4-Hematomblockad

- Frakturspalt identifieras och bedövas med 15 ml mepivakain 10 mg/ml eller motsvarande

5-Axialdrag

- Axialdrag appliceras, antingen manuellt eller med fingerfälla

6-Reponeringsmanöver

- Vinkelfställningen överdrivs
- Vinkelfställning rätas ut

7-Immobilisering

- Gipsskena appliceras under pågående axialdrag

8-Kontrollröntgen

- Kontrollröntgen efter reponering beställs

9-Vidare handläggning

- Arrangera lämplig uppföljning:
 - snar operation om frakturläget efter reponeringsförsök är dåligt i förhållande till patientens funktionskrav
 - annars återbesök om 7-10 dagar med kontrollröntgen